

## Follikelstimulation für IVF/ICSI

### „low-dose-protocol“ (Schema Orgalutran/Cetrotide)

Anmeldung:  
Tel.: 05042 / 940-360  
[www.kinderwunsch.com](http://www.kinderwunsch.com)

Hotline:  
Tel.: 05042 / 940-361  
Tel.: 05042 / 940-363  
Fax: 05042 / 940-308

#### Sehr geehrte Patientin,

bei Ihnen ist eine In-vitro-Fertilisationsbehandlung geplant. Um eine optimale Follikelreifung (= Eizellreifung) zu erreichen, haben wir eine spezielle Hormonbehandlung vorgesehen.

- Vorbereitung durch Ovarsuppression im Vorzyklus mit einem Ovulationshemmer („Pille“, z.B. Microgynon).
- Am 9. Tag **nach** Einnahme der letzten „Pille“ (entspricht dem 6. Zyklustag – siehe Eintrag Therapieplan):  
Ultraschalluntersuchung - zur Dokumentation der Follikelaktivität (auch kleinste Follikel),  
**ggf.** Blutentnahme (FSH, LH, E-2),  
Stimulation mit **Gonal-F oder Puregon** , 150 i.E. tgl. ab 6. ZT,  
evtl. in Kombination mit 1 bis 2 Ampullen **Menogon HP oder Luveris**
- Wiedervorstellung nach fünftägiger Stimulation (11. Zyklustag – siehe Eintrag Therapieplan):  
Ultraschalluntersuchung,  
**ggf.** Blutentnahme (FSH, LH, E2, Progesteron), **ggf.** Ovulationsauslösung;  
bei noch nicht ausreichender Follikelreifung: Fortsetzung der Stimulation; ggf. zusätzlich Gabe von **Orgalutran 0,25 mg/Cetrotide 0,25 mg** 1x täglich spät abends bis zur Ovulationsauslösung

